NL

MENOFORT®

+ probioticum

Menopauzale verschijnselen - warmteopwellingen

Samenstelling:

Ingrediënten per tablet: Raftiline 330 mg – sorbitol (vulstof) - Raftilose 125 mg – Microbiota-mengsel (Lactobacillus acidophillus, Bifidobacterium breve, Streptococcus thermophillus) 500.106 CFU - Soja droogextract (Glycine max) 50 mg gestandaardiseerd op 20 mg isoflavonen – Salie droogextract (Salvia officinalis) 50 mg gestandaardiseerd op 2.5 % rosmarinezuur – microkristallijn cellulose (vulstof) – Zilverkaars droogextract (Cimicifuga racemosa) 40 mg gestandaardiseerd op 2.7 % triterpeensaponinen (uitgedrukt in deoxyacteïne) – siliciumdioxide (antiklontermiddel) - vitamine E (d-alfa-tocoferylacetaat) 15 mg (150 % ADH) – magnesiumstearaat (smeermiddel).
*ADH = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid

Vorm, toedieningswijze en verpakking:

Tabletten bestemd voor orale inname.
Doos van 60 tabletten, in blisterverpakking.

Eigenschappenvan MENOFORT®:

Menofort® is een combinatie van zorgvuldig gekozen plantenextracten en nutriënten waarmee de verschijnselen van de menopauze op een zachte manier worden aangepakt. De in Menofort® aanwezige Soja, genetisch niet-gemanipuleerd, en Salie zorgen voor een aanvoer van fyto-oestrogenen, actieve stoffen die gebruikt worden bij opvliegers, prikkelbaarheid en overmatige transpiratie ten gevolge van de menopauze. Het probioticum-mengsel bevordert een goede darmflora waardoor de fyto-oestrogenen beter worden omgezet in actieve vormen en dus nog beter hun werking kunnen uitvoeren.
Zilverkaars of Cimicifuga racemosa is een plant die helpt op natuurlijke wijze het lichamelijke evenwicht in stand te houden, zonder het lichamelijke verouderingsproces te beïnvloeden. Op deze manier helpt Zilverkaars op een milde en doeltreffende wijze bij overgangsverschijnselen zoals opvliegers, nachtelijk transpireren en innerlijke onrust. Vitamine E, gekend als antioxidant, wordt gebruikt ter bescherming tegen vrije radicalen en houdt uw uiterlijk fris en jeugdig.

Indicatie:

Dit voedingssupplement ondersteunt opvliegers, prikkelbaarheid en overmatige transpiratie ten gevolge van de menopauze.

Dosering en gebruiksaanwijzing:

1 tablet 's morgens en 1 tablet 's avonds met water of andere drank innemen, tijdens of onmiddellijk na de maaltijd.
Gelieve Menofort® niet in te nemen met een warme drank.
De ondersteuning die Menofort® biedt bij overgangsverschijnselen treedt geleidelijk op en is na een aantal weken optimaal. Het veranderingsproces in het lichaam is tijdens de menopauze continu; daarom wordt aanbevolen Menofort® dagelijks te gebruiken indien u de overgangsverschijnselen optimaal wilt helpen verminderen.

Ongewenste effecten:

Tot op heden werden er met het voedingssupplement Menofort® nog geen ongewenste effecten gerapporteerd in de aangegeven posologie.
Mogelijke ongewenste effecten bij inname van een overdosering: hoofdpijn, allergische reacties, constipatie, misselijkheid, braken, hypothyroïdie.

Bijzondere voorzorgsmaatregelen:

- Voedingssupplementen kunnen niet gebruikt worden ter vervanging van een gevarieerde voeding.
- Gebruik Menofort® niet bij:
  - overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van het preparaat.
  - allergie aan Soja
  - aandoeningen die hormoonafhankelijk zijn of een voorgeschiedenis daarvan (bv. borstkanker, endometriumkanker).
  - zwangerschap en borstvoeding
- Menofort® mag alleen maar worden gebruikt bij volwassenen.
- Voorzichtigheid is geboden bij gelijktijdig gebruik van anti-tumorale geneesmiddelen (oa. tamoxifeen, raloxifeen en aromatase-inhibitoren). Bij inname van deze middelen gelieve steeds het advies te vragen aan uw behandelende arts.
- Er zijn geen gegevens over het effect van Menofort® op het vermogen om voertuigen te besturen. Een effect is echter onwaarschijnlijk.
- Bij een overdosering kunnen ongewenste effecten optreden die spontaan verdwijnen wanneer de dosering wordt verlaagd. Wanneer u teveel Menofort® heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245245). Er werden echter nog nooit gevallen van overdosering met Menofort® beschreven.

Bewaring:

Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C) in de originele verpakking.
Buiten het bereik en zicht van jonge kinderen bewaren.
De aanbevolen hoeveelheid niet overschrijden.
Ten minste houdbaar tot het einde van de maand vermeld op de verpakking.

Menofort® is verkrijgbaar in de apotheek.

Bijkomende informatie:

Nettogewicht: 66 g

Firma:

Sanifort Pharma n.v.
Interleuvenlaan 62 zone 2
B-3001 Leuven
info@sanifortpharma.be
Tel.: 016/39.47.81

FR

MENOFORT®

+ probiotiques

Symptômes ménopausiques- bouffées de chaleur

Composition:

Ingrédients par comprimé: Raftiline 330 mg – sorbitol (excipient) – Raftilose 125 mg - Complexe de probiotiques (Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium breve 25 mg, Streptococcus thermophillus) 500.106 CFU - extrait sec de Soja (Glycine max) 50 mg standardisé à 20 mg d'isoflavones - extrait sec de Sauge (Salvia officinalis) 50 mg standardisé à 2,5 % d'acide rosmarinique – cellulose microcristalline (excipient) – extrait sec d'Actée à grappes (Cimicifuga racemosa) 40 mg standardisé à 2,7 % de saponines triterpéniques (exprimés en déoxyactéine) - dioxyde de silicium (antiagglomérant) - vitamine E (acétate de d-alpha-tocophérol) 15 mg (150 % AJR) – stéarate de magnésium (lubrifiant).
*AJR = Apport Journalier Recommandé

Forme, voie d'administration et conditionnement:

Comprimés pour administration orale.
Boîte de 60 comprimés sous blister.

Caractéristiques de MENOFORT®:

Menofort® est une association d'extraits de plantes et de nutriments rigoureusement sélectionnés pour soulager en douceur les symptômes de la ménopause. Le Soja (non génétiquement modifié) et la Sauge contiennent des phyto-oestrogènes. Ces substances sont actives contre les bouffées de chaleur, l'irritabilité et la transpiration excessive suite à la ménopause.
Les probiotiques favorisent une bonne flore intestinale. C'est au niveau intestinal que se fait la transformation des phyto-oestrogènes sous leur forme active. Le complexe de probiotiques présent dans Menofort®, en optimalisant cette transformation, rend Menofort® plus efficace.
L'Actée à grappe ou Cimicifuga racemosa est une plante qui contribue naturellement à préserver l'équilibre physique. C'est une aide efficace face aux symptômes de la ménopause.
La vitamine E est un antioxydant. Utilisé pour protéger des radicaux libres, elle aide à lutter contre le vieillissement.

Indications:

Ce complément alimentaire est destiné à soulager les symptômes de la ménopause tels que les bouffées de chaleur.

Dosage et mode d'emploi:

1 comprimé matin et soir. A prendre avec de l'eau ou une autre boisson, pendant ou après le repas. Ne prenez pas Menofort® avec une boisson chaude. Il faut plusieurs semaines avant d'observer les effets de

Menofort® . Il est donc recommandé de prendre Menofort® quotidiennement sur le long terme pour bénéficier d'un effet optimal.

Effets indésirables:

Aucun effet indésirable n'a été décrit à ce jour avec Menofort® aux doses recommandées. En cas d'utilisation d'une trop forte dose, les effets suivants pourraient survenir: maux de têtes, réaction de type allergique, constipation, nausées, vomissements, l'hyperthyroïdie.

Précautions particulières:

- Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée.
- Ne pas prendre Menofort® en cas:
  - d'hypersensibilité à un des composants
  - d'allergie au Soja
  - d'affections hormono-dépendantes ou d'antécédents (p.e. cancer du sein, cancer de l'endomètre).
  - de grossesse ou d'allaitement.
- Menofort® ne peut être utilisé que chez l'adulte.
- La prudence est de mise en cas de prise de médicaments anti-tumoraux (Tamoxifène, Raloxifène ou inhibiteurs de l'aromatase), consulter un médecin à ce sujet.
- Bien qu'il n'y ait pas de données relatives aux conséquences de la prise de Menofort® sur la conduite d'un véhicule, un quelconque effet semble improbable.
- Aucun surdosage n'a été décrit à ce jour avec Menofort®. En cas d'utilisation d'une trop forte dose, consultez votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoison (070/245245).

Conservation:

Conserver dans l'emballage d'origine à température ambiante (15-25°C), hors de la portée et de la vue des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose recommandée. Ne plus utiliser le produit après la date de péremption (dernier jour du mois mentionné sur l'emballage).

Menofort® est disponible en pharmacie.

Information supplémentaire:

Poids net: 66 g

Entreprise:

Sanifort Pharma s.a.
Interleuvenlaan 62 zone 2
B-3001 Leuven
info@sanifortpharma.be
Tel.: 016/39.47.81

AL

MENOFORT®

+Probiotikum

Menopausale Symptome - Hitzewallungen

Zusammensetzung:

Bestandteile je Tablette: Raftilin 330 mg – Sorbit (Füllstoff) - Raftilose 125 mg – Mikrobiotakomplex (Lactobacillus acidophillus, Bifidobacterium breve, Streptococcus thermophillus) 500.106 CFU - Soja-Trockenextrakt (Glycine max) 50 mg standardisiert auf 20 mg Isoflavone - Salbei-Trockenextrakt (Salvia officinalis) 50 mg standardisiert auf 2,5 % Rosmarinsäure - mikrokristalline Cellulose (Füllstoff) - Trockenextrakt aus Traubensilberkerze (Cimicifuga racemosa) 40 mg standardisiert auf 2,7 % Triterpensaponine (ausgedrückt in Deoxyacetein) - Siliciumdioxid (Antiklumpmittel) - Vitamin E (D-Alpha-Tocopherol Acetaat) 15 mg (150 % ETD) - Magnesiumstearat (Schmiermittel).
*ETD = Empfohlene Tagesdosis

Form, Verabreichungsweg und Verpackung:

Tabletten zur oralen Einnahme.
Packung mit 60 Tabletten;
Blisterverpackung

MENOFORT® - Eigenschaften

Menofort® ist eine Zusammensetzung von sorgfältig auserwählten Pflanzenextrakten und Nährstoffen, die auf sanfte Weise menopausale Beschwerden lindert. Das in Menofort® enthaltene (genetisch unveränderte) Soja versorgt den Körper gemeinsam mit Salbei mit Phytoöstrogenen. Dies sind Wirkstoffe, die menopausale Symptome wie Hitzewallungen, Gereiztheit und übermäßiges Schwitzen hemmen.
Der Probiotikumkomplex fördert eine gesunde Darmflora, wodurch die Phytoöstrogene besser in ihre aktive Form umgewandelt werden und folglich effektiver sind. Traubensilberkerze oder Cimicifuga racemosa ist eine Pflanze, die auf natürlichem Wege und ohne Beeinflussung des normalen Alterungsprozesses zur Instandhaltung des körperlichen Gleichgewichtes beiträgt. Auf diese Weise bewirkt die Traubensilberkerze eine milde und effektive Bekämpfung menopausaler Symptome wie Hitzewallungen, nächtliches Schwitzen und innere Unruhe. Vitamin E, ein Antioxidans, schützt gegen freie Radikale und sorgt für ein frisches und jugendliches Aussehen.

Indikation:

Diese Nahrungsmittelergänzung trägt zur Linderung von Menopausesymptomen wie Hitzewallungen, Reizbarkeit und übermäßiges Schwitzen bei.

Dosierung und Gebrauchsanweisung:

1 Tablette morgens und abends während oder sofort nach dem Essen mit Wasser oder einem anderen Getränk einnehmen. Menofort® bitte nicht mit einem warmen Getränk einnehmen. Die Wirkung von Menofort® tritt allmählich ein und ist erst nach einigen Wochen optimal. Während der Menopause setzt sich der Alterungsprozess ununterbrochen fort. Um eine optimale Linderung der menopausalen Beschwerden zu erzielen, ist es daher ratsam, Menofort® täglich zu gebrauchen.

Nebenwirkungen:

Bis zum heutigen Tage wurden für die Nahrungsmittelergänzung Menofort® in der empfohlenen Dosis keine Nebenwirkungen gemeldet.
Mögliche Nebenwirkungen bei Einnahme einer zu hohen Dosis sind: Kopfschmerzen, allergische Reaktionen, Konstipation, Übelkeit, Erbrechen, Hypothyreose.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen:

- Nahrungsmittelergänzungen sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung.
- Menofort® nicht verwenden bei:
  - einer Überempfindlichkeit für einen der Bestandteile des Präparates
  - einer Sojaallergie
  - einer hormonal bedingten Erkrankung oder einer solchen Vorgeschichte (z.B.Brustkrebs, Gebärmutterschleimhautkrebs)
  - Schwangerschaft und während der Stillzeit
- Menofort® darf nur von Erwachsenen verwendet werden.
- Bei gleichzeitiger Einnahme tumorbekämpfender Arzneimittel (u.a. Tamoxifen, Raloxifen und Aromatasehemmer). Bei Einnahme dieser Mittel sollten Sie stets den Rat Ihres Arztes einholen.
- Über die Auswirkung von Menofort® auf die Fahrtüchtigkeit liegen keine Daten vor. Eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit ist jedoch unwahrscheinlich.
- Bei einer Überdosierung können Nebenwirkungen auftreten, die nach einer Dosisreduzierung wieder spontan verschwinden. Wenn Sie eine zu hohe Dosis benutzt haben, sollten Sie unverzüglich mit Ihrem Arzt, Apotheker oder dem Antigiftzentrum (070/245245) Kontakt aufnehmen. Bislang wurde jedoch noch nie eine Menofort® -Überdosierung gemeldet.

Lagerung:

Kühl und trocken in der Originalverpackung aufbewahren.
Außerhalb der Reichweite und Sicht von Kindern aufbewahren.
Die empfohlene Dosis nicht überschreiten.
Mindestens haltbar bis zum Ende des auf der Verpackung erwähnten Monats.

Intestifort® ist rezeptfrei erhältlich in der Apotheke.

Zusatzinformationen:

Nettogewicht: 12 g

Hersteller:

Sanifort Pharma A.G.
Interleuvenlaan 62 zone 2
B-3001 Leuven
info@sanifortpharma.be
Tel.: 016/39.47.81